

Voltis B

Variedad de uva de vino.



Origen

La variedad Voltis fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Villaris y el INRA 3159-2-12.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Voltis

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Voltis está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con ribete carmíneo, que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde, con una densidad media de pelos tumbados en la cara inferior,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares, enteras o con tres lóbulos, con un seno peciolar en V abierto, dientes cortos a medianos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo duro, brillante, plano o con bordes hacia el haz, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada con presencia bastante abundante de lenticelas.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1.7

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	194	246	238	243	239
Allele 2	149	248	249	182	200	252	248	247	271

Cultivo y habilidades agronómicas

La variedad Voltis es vigorosa y tiene un porte semi-erguido erguido. Es poco a moderadamente fértil y debe manejarse en poda larga. Los pámpanos del Voltis son un poco sensibles a la rotura a la altura de los nudos y puede sufrir en caso de carencia de magnesio y potasio.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Voltis lleva el número 1266.

Fenología

época de desborre: 12 días después de la variedad Chasselas.
época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos del Voltis son de tamaño mediano y moderadamente compactos. Las bayas son también de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa moderadamente jugosa.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Voltis es resistente al mildiu y al oídio, pero es sensible al black rot.
Según el obtentor, para preservar los factores de resistencia, según los conocimientos actuales, es indispensable realizar dos tratamientos fungicidas contra el mildiú y el oídio. Esta protección debe reforzarse en caso de fuerte presión de la enfermedad.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- [Ficha varietal Voltis](#). INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*