

# Voltis B

Variedad de uva de vino.



## Origen

La variedad Voltis fue obtenida por el INRA. Se trata de un híbrido interespecífico resultado de un cruce entre el Villaris y el INRA 3159-2-12.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Voltis

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Voltis está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2018, en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven con ribete carmíneo, que presenta una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde, con una densidad media de pelos tumbados en la cara inferior,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color rojo,
- a las hojas adultas de color verde oscuro, orbiculares, enteras o con tres lóbulos, con un seno peciolar en V abierto, dientes cortos a medianos en relación a su base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo duro, brillante, plano o con bordes hacia el haz, con hinchazón, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados y erguidos,
- a las bayas de forma redondeada con presencia bastante abundante de lenticelas.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

1.7

## Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	236	239	178	194	246	238	243	239
Allele 2	149	248	249	182	200	252	248	247	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

La variedad Voltis es vigorosa y tiene un porte semi-erguido. Es poco a moderadamente fértil y debe manejarse en poda larga. Los pámpanos del Voltis son un poco sensibles a la rotura a la altura de los nudos y puede sufrir en caso de carencia de magnesio y potasio.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Voltis lleva el número 1266.

### Fenología

época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 2 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos del Voltis son de tamaño mediano y moderadamente compactos. Las bayas son también de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo de grosor medio y una pulpa moderadamente jugosa.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Voltis es resistente al mildiu y al oídio, pero es sensible al black rot. En situaciones de riesgo, la protección con fungicidas sigue siendo indispensable.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.

- Ficha varietal Voltis. INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*