

Vintaghju N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad sería autóctona de Haute-Corse.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Vintaghju

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

Datos regulatorios

En Francia, el Vintaghju está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2020, en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco con ribete carmíneo, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas, con, en el envés del limbo, una densidad elevada de pelos tumbados entre los nervios,
- a los pámpanos herbáceos con entrenudos de color verde o de estrías rojas y zarcillos largos a muy largos,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales superiores bastante profundos, abiertos con fondo en U, un seno peciolar abierto en U, con fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes pequeños a medianos, de largo mediano a elevado en relación a su base, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo verde oscuro, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a los racimos largos, en ocasiones estriados con extremidades bífidas,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	133	223	233	178	196	240	238	233	261
Allele 2	149	229	247	186	204	260	254	243	271

Cultivo y habilidades agronómicas

El Vintaghju es poco fértil. Posee un porte semi-erguido a horizontal y produce pámpanos largos que precisan colocarse en espaldera. Esta variedad también puede ser sensible al millerandaje.

Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Vintaghju lleva el número 1338.


Se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de 6 clones en Córcega.

Fenología

época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.

época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement




Potencial tecnológico

Los racimos del Vintaghju son grandes y muy compactos. Las bayas son de tamaño mediano, de sabor simple, con un pellejo fino, con un poco de pruina y una pulpa muy jugosa. Los vinos presentan una buena acidez y los taninos están bastante presentes. Su color puede ser excelente, rojo vino sostenido. El perfil aromático de los vinos se articula en torno a los frutos negros y las especias.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es sensible a la podredumbre gris y a la yesca.

Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Corse, 2016, San Giuliano, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*