

# Aladin N

Variedad ornamental para aficionados.



## Origen

Esta variedad se obtuvo en 1979 por el INRA. Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el 7489 INRA y el Muscat de Hambourg.

## Usar

Variedad ornamental para aficionados.

## Nombre de la variedad en Francia

Aladin

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Aladin está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja a media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes o verdes con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares de color verde oscuro, de tres, cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar con fondo en U, poco abierto o cerrado con bordes superpuestos, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos o convexos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo liso, ligeramente abultado y con bordes hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año

2018

ha

0

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	182	192	240	236	235	255
Allele 2	147	236	260	186	202	262	248	243	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Aladin posee un vigor medio. Es una variedad bastante fértil con un porte horizontal. El Aladin se puede manejar en poda larga moderada y debe ser empalizada.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Aladin lleva el número 5001.

### Fenología

Época de desborre: 1 día después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

### Potencial tecnológico


Los racimos del Aladin son medianos a grandes, moderadamente compactos y las bayas son pequeñas a medianas, jugosas, con una piel gruesa y sabor simple.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Aladin es poco sensible al mildiu, al oídio, a la antracnosis, al black rot y a la podredumbre gris, pero debe injertarse.

A pesar de las tolerancias descritas, es necesaria una protección fungicida mínima para proteger adecuadamente la vegetación y la vendimia, especialmente en las cosechas en las que la presión de las enfermedades es elevada.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*