

Nuevo

# Gueuche noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Gueuche noir es originario de los viñedos de los departamentos de Franche-Comté y Ain. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Gueuche noir

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

## Datos regulatorios

En Francia, el Gueuche noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven de color blanco, que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo con zonas bronceadas, con una densidad elevada de pelos tumbados y una densidad baja de pelos erguidos,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo,
- a las hojas adultas orbiculares, de tamaño de pequeño a mediano, con tres o cinco lóbulos con senos laterales largos con base en U, un seno peciolar en forma de lira abierta, dientes medianos con lados rectilíneos y convexos, nervios verdes, un limbo grueso, plano o ligeramente revoluto, con una hinchazón gruesa, abultado cerca del peciolo y, en el envés del limbo, una densidad de media a elevada de pelos tumbados y pelos erguidos,
- a las bayas que son de forma redondeada.

# Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	249	178	196	244	248	235	249
Allele 2	149	238	262	186	204	246	254	245	271

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Gueuche noir es una variedad productiva y con porte erguido. Tras una helada de primavera, los rebrotes son fértil y esta variedad es poco susceptible la corredera.

## Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad. Un conservatorio de tres clones fue plantado en el Jura.

## Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


## Potencial tecnológico

Los racimos de Gueuche noir son medianos y bastante compactos. Las bayas son de tamaño medio, de sabor neutro y con un pellejo fino. Los vinos son de color claro y pueden ser duros y bastante ácidos.


## Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Gueuche noir es sensible a las enfermedades criptogámicas, en particular a la podredumbre gris.

## Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, París, Francia.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*