

Nuevo

Ribier noir N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Ribier noir es una variedad tradicional de los viñedos de los departamentos Ardèche y Drôme. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Ribier noir

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Petit Ribier" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Ribier noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, de color blanco con ribete carmíneo y que presenta una densidad elavada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas o cobrizas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo o con estrías,
- a las hojas adultas pentagonales o cuneiformes, con tres o cinco lóbulos con sinos laterales bastante profundos a veces con un diente en la base, un sino peciolar en forma de U o en V abierta, con fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes bastante largos, con un lado cóncavo y un lado convexo, mucrones, una baja pigmentación antociánica de los nervios, un limbo mate, plano, con una fina hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad de baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 178 | 196 | 244 | 238 | 235 | 261 |
| Allele 2 | 131 | 232 | 249 | 178 | 204 | 260 | 240 | 245 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Ribier noir es regularmente fértil, vigoroso y de porte erguido a semierguido.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos de Ribier noir son de tamaño pequeño a mediano, a veces alados, compactos, con bayas de tamaño mediano y pellejo fino. Esta variedad produce un vino corriente, agradable, de color claro y que debe se beber rápidamente.


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ribier noir es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France, (bajo el nombre de «Petit Ribier»).
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France, (bajo el nombre de «Rivier»).



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*