

Nuevo

# Ribier noir N

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Ribier noir es una variedad tradicional de los viñedos de los departamentos Ardèche y Drôme. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, esta variedad sería probablemente una descendiente del Gouais blanc.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Ribier noir

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Petit Ribier" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Ribier noir está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A, pero todavía no está clasificado.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, de color blanco con ribete carmíneo y que presenta una densidad elavada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes con zonas bronceadas o cobrizas, con una densidad media de pelos tumbados,
- a los pámpanos herbáceos de color rojo o con estrías,
- a las hojas adultas pentagonales o cuneiformes, con tres o cinco lóbulos con sinos laterales bastante profundos a veces con un diente en la base, un sino peciolar en forma de U o en V abierta, con fondo a veces limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes bastante largos, con un lado cóncavo y un lado convexo, mucrones, una baja pigmentación antociánica de los nervios, un limbo mate, plano, con una fina hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad de baja a media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

# Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	196	244	238	235	261
Allele 2	131	232	249	178	204	260	240	245	271

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Ribier noir es regularmente fértil, vigoroso y de porte erguido a semierguido.

### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


## Potencial tecnológico

Los racimos de Ribier noir son de tamaño pequeño a mediano, a veces alados, compactos, con bayas de tamaño mediano y pellejo fino. Esta variedad produce un vino corriente, agradable, de color claro y que debe se beber rápidamente.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Ribier noir es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas.

## Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France, (bajo el nombre de «Petit Ribier»).
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, Francia.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France, (bajo el nombre de «Rivier»).



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*