

Nuevo

# Einset seedless Rs

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por George Remaily (Estados Unidos). Este híbrido interespecífico es el resultado de un cruce entre el Fredonia (Vitis labrusca – Vitis vinifera) y el Canner seedless.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

#### Nombre de la variedad en Francia

Einset seedless

#### Sinonimia

Esta variedad se podía encontrar bajo su código de hibridador "NY 63-878-1" pero este sinónimo no se retuvo en los textos oficiales.

## **Datos regulatorios**

En Francia, el Einset seedless está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2021 en la lista A.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven, de color verde y que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas y ribete carmíneo, y una densidad de media a elevada de pelos tumbados,
- a las hojas adultas medianas a grandes, cuneiformes o pentagonales, con tres o cinco lóbulos, senos laterales poco profundos en forma de U, un seno peciolar en forma de lira cerrada, dientes muy pequeños, cortos en relación a su anchura en la base, con lados rectilíneos o cóncavos, una ligera pigmentación antociánica cerca del peciolo, un limbo plano y con una fina hinchazón y, en el envés del limbo, una baja densidad de pelos tumbados y una densidad nula de pelos erguidos,
- a las bayas que son de forma elíptica corta y de color rosa en su madurez.

## Perfil genético

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	0	232	235	182	0	0	242	0	0
Allele 2	0	234	239	191	0	0	248	0	0

## Cultivo y habilidades agronómicas

El Einset seedless es una variedad vigorosa y bastante productiva que resiste bastante bien el frío del invierno.


## Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.


#### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas. Época de maduración: precoz, 1 semana antes de la variedad Chasselas.

## Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- New York's food and life sciences bulletin, B. Reisch et al., 1985.
- Table grapes for cool climates, B. Reisch et al., 1993.

## Potencial tecnológico

Los racimos de Einset seedless son de tamaño pequeño a mediano. Las bayas son pequeñas, con un sabor ligeramente foxé y pepitas rudimentarias que a veces se notan porque están lignificadas. El Einset seedless presenta una buena aptitud para la conservación. Los tratamientos con ácido giberélico y la práctica de la incisión anular pueden aumentar el tamaño de las bayas.

## Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Einset seedless es sensible al mildiu y al oídio. Sin embargo, esta variedad es resistente a la podredumbre gris y es bastante tolerante a la filoxera.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier