

# Caladoc N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida en 1958 por el INRA mediante el cruce entre el Grenache y el Cot.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Caladoc

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, el Caladoc está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad media de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de color verde,
- a las hojas adultas de tres lóbulos, con un seno peciolar abierto en U, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base y de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo ligeramente ondulado y, en el envés del limbo, una densidad muy baja de pelos tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica y que presentan manchas particulares (punteado) en la pruina.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|
| ha  | 64   | 914  | 2258 | 5066 |

## Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1       | 143  | 223   | 239   | 188    | 188     | 258     | 240    | 233    | 239    |
| Allele 2       | 149  | 236   | 239   | 191    | 188     | 260     | 248    | 243    | 251    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Caladoc posee un vigor medio. Se puede gestionar en poda corta tipo gobelet. Su producción es regular y no sufre corredura.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Caladoc lleva el número 724.

### Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media a 4 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes, moderadamente compactos y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad permite elaborar unos vinos muy robustos y típicos, con un color intenso y una estructura tánica interesante (taninos bastante suaves, sin amargor, pero muy presentes). El Caladoc también se presta a la elaboración de vinos rosados afrutados y equilibrados.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Caladoc tolera bien la podredumbre gris y es poco sensible al oídio.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*