

Camaralet B

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad procede de los viñedos pirenaicos.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Camaralet

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Camaralet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de zonas bronceadas,
- a las hojas adultas de cinco lóbulos con senos laterales profundos, abiertos, con fondo en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar abierto, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo plano y, en el envés del limbo, una densidad media de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |

Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 131 | 229 | 243 | 178 | 188 | 246 | 240 | 227 | 239 |
| Allele 2 | 149 | 234 | 249 | 186 | 200 | 260 | 254 | 233 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

[En proceso de redacción]

Selección clonal en Francia

Los dos clones autorizados de Camaralet llevan los números 1023 y 1024.

Se llevó a cabo una plantación de una decena de clones en un conservatorio en los viñedos de Jurançon (Pirineos Atlánticos).

Fenología

Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

El prestigio de esta variedad se basa en la calidad de sus vinos muy refinados (alcohólicos, melosos, amplios) y su tipicidad aromática (canela, pimienta, hinojo).

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a sus racimos muy sueltos, el Camaralet no suele ser muy sensible a la podredumbre gris, excepto cuando está demasiado maduro.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.



Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

