

Nuevo

# Magdeleine noire N

Variedad de uva de vino.



## Origen

La Magdeleine noire es una variedad probablemente muy antigua y que antes se cultivaba en todo el oeste de Francia.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Magdeleine noire

## Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea para esta variedad.

## Datos regulatorios

En Francia, la Magdeleine noire está inscrita oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" desde 2025 en la lista A, pero todavía no está clasificada.

---

## Elementos de descripción

[Redacción in curso]

# Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	149	225	239	178	188	260	233	239	248
Allele 2	149	234	247	188	194	260	235	270	248

## Cultivo y habilidades agronómicas

La Magdeleine noire es de vigor medio y presenta un porte semierguido a horizontal. Aunque esta variedad es bastante fértil en poda larga, es poco productiva en poda corta.

## Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

## Fenología

Época de desborre: 5 días antes de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 1ª época, 1 semana después de la variedad Chasselas.

## Debourrement

## Potencial tecnológico


Los racimos de la Magdeleine noire son de tamaño mediano, a veces alados y medianamente compactos. Las bayas son de tamaño mediano y con gran cantidad de pruina. La piel es de grosor medio y la pulpa es jugosa.

Los vinos obtenidos tienen mucho color, una acidez de mediana a baja y un perfil afrutado bastante complejo. Presentan aromas de frutos negros y regaliz, y tienen un buen equilibrio entre grasa y estructura.


En el pasado, la Magdeleine noire también se cultivaba en parras y se utilizaba como uva de mesa debido a su precocidad.

## Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Debido a su maduración precoz, la Magdeleine noire es poco sensible a la podredumbre gris, pero puede ser vulnerable a los ataques de las aves. Esta variedad presenta un alto nivel de tolerancia frente a la flavescencia dorada.



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages oubliés des Pyrénées. Petit catalogue de cépages. , Interreg., 2019, projet Valovitis.
- Le vigneron charentais ou l'art de cultiver la vigne et d'en soigner les produits, Raguenaud, 1847.
- Parentage of Merlot and related winegrape cultivars of southwestern France: discovery of the missing link. Boursiquot et al., 2009.
- La Magdeleine noire des Charentes, génitrice du Merlot et du Cot, (enfin) retrouvée dans un vignoble du bassin Sud-Ouest. O. Yobrégat, 2014, La Grappe d'antan n°99.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*