

# Alicante Henri Bouschet N

Variedad de uva de vino.



## Origen

Esta variedad fue obtenida por Louis y Henri Bouschet en 1855, en Mauguio (Hérault), mediante el cruce entre el Grenache y el Petit Bouschet (Aramon X Teinturier du Cher).

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Alicante Henri Bouschet

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Alicante Bouschet" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación. En España, el Alicante Henri Bouschet puede denominarse oficialmente "Garnacha tintorera" en España.

## Datos regulatorios

En Francia, el Alicante Henri Bouschet está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Italia y Portugal.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados con una distribución de la pigmentación antocianica en ribete,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- al pámpano herbáceo con entrenudos de estrías roja,
- a las hojas adultas enteras con una pigmentación antocianica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, brillante, liso, cuya pigmentación antocianica se vuelve intensa en otoño y, en el envés del limbo, una densidad media a elevada de pelos tumbados,
- a las bayas de forma redondeada, con pulpa con color,
- a los sarmientos de un color amarillo general.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	24168	20563	21996	15769	9393	7104	2460

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	188	244	240	243	249
Allele 2	143	236	243	191	188	258	240	259	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad es bastante vigorosa, pero debe ser podado corto pues tiene tendencia a secarse en ocasiones. Asimismo, es bastante sensible al viento.

### Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Alicante Henri Bouschet llevan los números 540, 803, 804 y 805.

### Fenología

Época de desborre: 4 días después de la variedad Chasselas.  
Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media a 3 semanas después de la variedad Chasselas.


### Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. Esta variedad tintorera se utiliza fundamentalmente por su aporte de color. Los vinos obtenidos son bastante grasos, a menudo planos y carecen de finura y elegancia.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Alicante Henri Bouschet está considerado como poco sensible al oídio. Por el contrario, su sensibilidad al mildiu, la excoriosis, la flavesencia dorada y la necrosis bacteriana es bastante elevada. También es sensible a las enfermedades de madera.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*