# Codivarta B

## Variedad de uva de vino.

**Origen**

Esta variedad la encontramos en Córcega.

**Usar**

Variedad de uva de vino.

**Nombre de la variedad en Francia**

Codivarta

**Sinonimia**

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Cudiverta" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

**Datos regulatorios**

En Francia, la Codivarta está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada.

---

**Elementos de descripción**

La identificación hace referencia:
- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad nula o muy baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes totalmente bronceadas o con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco o siete lóbulos, con un seno peciolar abierto en U, dientes pequeños, largos respecto a la anchura en la base, de lados rectilíneos o con un lado convexo y uno cóncavo, una pigmentación antociánica nula o baja de los nervios y, en el envés del limbo, una densidad nula o muy baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada o elíptica corta.

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| ha | 1 | 1 | 1 | 1.3 |

# Perfil genético

| Microsatellite | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allele 1 | 131 | 223 | 233 | 178 | 200 | 260 | 238 | 235 | 251 |
| Allele 2 | 133 | 225 | 249 | 178 | 204 | 260 | 254 | 259 | 251 |

### Cultivo y habilidades agronómicas

La Codivarta es una variedad de vigor medio con un porte semi- erguido a erguido.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Codivarta lleva el número 1085.

### Potencial tecnológico

Los racimos son grandes y las bayas de tamaño mediano. El potencial de azúcar de esta variedad es medio con una acidez media a baja.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

La Codivarta es poco sensible a la podredumbre gris.

### Fenología

Época de desborre: 7 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement




### Maturité




### Referencias bibliográficas


- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro


©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Les cépages insulaires ou le Riacquistu des cépages corses. CRVI de Córcega, 2016, San Giuliano, Francia.

*Plantuva, todos los derechos reservados,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados