

# Colombaud B

Variedad de uva de vino.



## Origen

El Colombaud es una variedad provenzal.

## Usar

Variedad de uva de vino.

## Nombre de la variedad en Francia

Colombaud

## Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "Bouteillan" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Colombaud está inscrito oficialmente en el "Catalogue des variétés de vigne" en la lista A y está clasificado.

---

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares de gran tamaño, enteras o de tres lóbulos, con un seno peciolar cerrado de lóbulos superpuestos, dientes medianos de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula de los nervios, un limbo con bordes hacia el envés, afectado por una gran hinchazón, abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma ligeramente elíptica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1979	2018
ha	1	2	0

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	243	176	186	240	254	257	239
Allele 2	131	223	243	182	188	256	266	257	261

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Colombaud es una variedad muy vigorosa, fértil en poda corta. Posee pámpanos en porte semi-erguido. Solo se adapta a los terrenos muy cálidos y fértiles.

### Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son grandes. El Colombaud produce unos vinos blancos secos, claros, brillantes y ácidos.

### Selección clonal en Francia

El único clon autorizado de Colombaud lleva el número 1313.

### Susceptibilidad a enfermedades y plagas


El Colombaud es bastante sensible a las enfermedades criptogámicas y, en particular, a la podredumbre gris.

Recientemente, se han llevado a cabo unas prospecciones en el viñedo provenzal.


### Fenología

época de desborre: 8 días después de la variedad Chasselas.  
 época de maduración: 3ª época, 4 semanas después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



---

*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*