

# Dattier de Beyrouth B

Variedad de uva de mesa.



## Origen

Esta variedad de uva de mesa de origen natural está presente en numerosos países.

## Usar

Variedad de uva de mesa.

## Nombre de la variedad en Francia

Dattier de Beyrouth

## Sinonimia

En la Unión Europea, el Dattier de Beyrouth es oficialmente denominado con otros nombres: Afuz Ali (Croacia, Hungría, Rumanía), Bolgar (Bulgaria), Roseti (España) y Rozaki (Grecia). Estos sinónimos están oficialmente reconocidos en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

## Datos regulatorios

En Francia, el Dattier de Beyrouth está oficialmente inscrito en el «Catalogue des variétés de vigne» en la **lista A**. Esta variedad también está inscrita en el registro de otros países miembros de la Unión Europea: Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Hungría, Portugal y Rumanía.

## Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes verdes con zonas bronceadas,
- al pámpano con entrenudos largos,
- a las hojas adultas pequeñas a medianas, orbiculares, de tres a cinco lóbulos, con un seno peciolar abierto, de bordes paralelos y con fondo en U ocasionalmente limitado por el nervio cerca del peciolo, dientes pequeños a medianos, de lados rectilíneos, una pigmentación antocianica nula o baja de los nervios, un limbo liso, brillante y, en el envés del limbo, una densidad nula de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica larga o cilíndrica.

# Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1508	1591	5695	191	42	49	24

## Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	186	244	248	233	257
Allele 2	133	229	249	182	188	252	254	257	271

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Dattier de Beyrouth es una variedad vigorosa, con un porte semi-erguido u horizontal. Se puede manejar en poda corta o larga, pero debe ser empalizado cuidadosamente pues la base de los pámpanos es frágil en primavera y son sensibles al viento. El Dattier de Beyrouth también es sensible a la corredura y al millerandaje.

### Selección clonal en Francia


Los tres clones autorizados de Dattier de Beyrouth llevan los números 304, 966 y 1223.

### Fenología


Época de desborre: 9 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 3ª época, 4 semanas y media después de la variedad Chasselas.

### Debourrement



## Maturité



## Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*