

Altesse B

Variedad de uva de vino.



Origen

La Altesse es una variedad autóctona de la Saboya.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Altesse

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, la Altesse está inscrita oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificada. Esta variedad también está inscrita en el registro de Chipre.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a las hojas jóvenes muy bronceadas,
- a las hojas adultas pequeñas, de tres lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes largos respecto a su ancho en la base y de lados convexos, un limbo rizado en los bordes, con bordes ligeramente hacia el haz y, en el envés del limbo, una densidad baja a media de pelos tumbados y una densidad media de pelos erguidos,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	175	206	129	175	294	348	408

Perfil genético

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	186	194	246	240	243	255
Allele 2	149	234	253	188	204	252	266	257	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad se maneja en poda corta tipo gobelet o en cordón Royat y Guyot simple. La Altesse produce los mejores resultados en cantizales arcillo-calcáreos, pedregosos y con una buena exposición (pendientes, microclimas bastante luminosos).

Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños a medianos y las bayas son pequeñas. El potencial cualitativo de esta cepa es importante. Permite obtener unos vinos generosos, robustos, ricos en aromas, a la vez que elegantes, delicados y con potencial de guarda.

Selección clonal en Francia

Los tres clones autorizados de Altesse llevan los números 265, 403 y 404. Un conservatorio de una decena clones fue plantado en Saboya en 2014.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas


Esta delicada variedad es muy sensible al mildiu, a la excoriosis, a la acariosis, así como al oídio. También soporta mal la podredumbre gris.

Fenología


Época de desborre: como la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*