

Duras N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de la región de Gaillac o Ariège. Según los análisis genéticos realizados en Montpellier, sería el resultado de un cruce entre el Savagnin y el Tressot.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Duras

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Duras está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color amarillo,
- a las hojas adultas orbiculares, de cinco, siete o nueve lóbulos, con senos laterales muy profundos, con fondo en U y un diente bastante frecuente en el fondo, un seno peciolar con fondo en ocasiones limitado por el nervio de un lado cerca del peciolo, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo alabeado, con bordes hacia el envés y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	87	75	476	761	949	1063	794

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	243	176	188	246	238	233	239
Allele 2	149	236	249	186	200	256	248	267	271

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad con una buena fertilidad debe manejarse preferentemente en poda corta. Las ramas y los troncos de la Duras son duros y su porte es erguido.

Selección clonal en Francia

Los cuatro clones autorizados de Duras llevan los números 554, 555, 627 y 654. Desde 1998, se conservan más de 120 clones en los viñedos de Gaillac (Tarn).

Fenología

Época de desborre: 5 días después de la variedad Chasselas.
Época de maduración: 2ª época, 3 semanas después de la variedad Chasselas.


Potencial tecnológico

Los racimos son medianos a grandes y las bayas son de tamaño mediano. El Duras posee un buen potencial de acumulación de azúcares. Los vinos obtenidos presentan un color moderado, pero poseen una tipicidad marcada (notas de pimienta).


Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Duras es bastante sensible a la excoriosis, al oídio, a los ácaros (sobre todo en primavera) y a la eutipiosis.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*