

# Elbling B

### Variedad de uva de vino.



### Origen

Esta variedad en otro tiempo cultivada en el noreste de Francia es, según los análisis genéticos publicados, probablemente una descendiente del Gouais blanc.

#### Usar

Variedad de uva de vino.

### Nombre de la variedad en Francia

Elbling

#### Sinonimia

En Austria, el Elbling es oficialmente denominado "Weisser Elbling". Este sinónimo está oficialmente reconocido en Francia por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

### **Datos regulatorios**

En Francia, el Elbling está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en los registros de otros países miembros de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido y Luxemburgo.

### Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas ligeramente bronceadas,
- a las hojas adultas de tres o cinco lóbulos con un seno peciolar poco abierto con base en V, dientes largos de lados rectilíneos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo con bordes hacia el haz, con abultamiento, plisado cerca del peciolo, con hinchazón y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma redondeada.

### Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2018 |
|-----|------|------|------|------|------|
| ha  | 323  | 127  | 3    | 2    | 1.1  |

### Perfil genético

| Microsatelli | teVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1     | 141    | 236   | 249   | 176    | 194     | 238     | 248    | 227    | 239    |
| Allele 2     | 149    | 238   | 257   | 186    | 204     | 246     | 254    | 233    | 271    |

### Cultivo y habilidades agronómicas

El Elbling es una variedad muy vigorosa, que debe manejarse en poda larga. Se muestra sensible a la carencia en magnesio.

#### Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

#### Fenología

Época de desborre: 3 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 2 semanas y media después de la variedad Chasselas.


## Potencial tecnológico

Los racimos son pequeños, mientras que las bayas son grandes. El Elbling produce unos vinos ácidos y ordinarios.


### Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Elbling es sensible al mildiu y a las polillas del racimo. Es muy sensible a la podredumbre gris.

### Debourrement



### Maturité



### Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro ©2023 Plantgrape, todos los derechos reservados

Montpellier, Marseillan, Francia.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.











Plantuva, todos los derechos reservados, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier