

Etraire de la Dui N

Variedad de uva de vino.



Origen

Esta variedad es originaria de Isère.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Etraire de la Dui

Sinonimia

No existe ningún sinónimo oficialmente reconocido en Francia, ni en los demás países de la Unión Europea.

Datos regulatorios

En Francia, el Etraire de la Dui está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad elevada de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas bronceadas,
- a las hojas adultas anchas, de cinco lóbulos con un seno peciolar de lóbulos ligeramente superpuestos, dientes medianos de lados convexos, una pigmentación antociánica media de los nervios, un limbo ondulado entre los nervios cerca del peciolo, ligeramente abultado y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos erguidos y tumbados,
- a las bayas de forma elíptica corta.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

Año	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	406	387	48	16	7	6	4.1

Perfil genético

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	176	188	252	238	233	239
Allele 2	149	232	243	186	194	256	248	267	239

Cultivo y habilidades agronómicas

Esta variedad muy vigorosa es bastante fértil y productiva. Se puede manejar en poda corta. El Etraire de la Dui se muestra bastante sensible a las heladas de invierno. Se comporta bien en terrenos arcilloso-calcareos profundos y en laderas. Al alcanzar la maduración, podemos observar una tendencia al desgranado.

Potencial tecnológico

Los racimos y las bayas son mediados a grandes. El Etraire de la Dui puede ofrecer vinos de guarda, con color, robustos y tánicos (en ocasiones, astringentes).

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

Esta variedad es poco sensible al oídio.

Selección clonal en Francia


El único clon autorizado de Etraire de la Dui lleva el número 1070. En 1999, se llevó a cabo la plantación de un conservatorio de una docena de clones en los viñedos de Saboya.

Fenología


Época de desborre: 6 días después de la variedad Chasselas.

Época de maduración: 2ª época, 3 semanas y media después de la variedad Chasselas.

Debourrement



Maturité



Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, Francia.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala y V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, París, Francia.



*Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*