

Florental N

Variedad de uva de vino.



Origen

El Florental (híbrido interespecífico) procede de un cruce entre el 8365 Seibel y el Gamay.

Usar

Variedad de uva de vino.

Nombre de la variedad en Francia

Florental

Sinonimia

En Francia, esta variedad puede denominarse oficialmente "7705 Burdin" por lo que respecta al material vegetal de multiplicación.

Datos regulatorios

En Francia, el Florental está inscrito oficialmente en el «Catalogue des variétés de vigne» en la lista A y está clasificado. Esta variedad también está inscrita en el registro de Países Bajos.

Elementos de descripción

La identificación hace referencia:

- a la extremidad del pámpano joven que presenta una densidad baja de pelos tumbados,
- a las hojas jóvenes de color verde con zonas rojizas,
- a las hojas adultas orbiculares o cuneiformes, de cinco lóbulos, con un seno peciolar en U abierto, dientes largos en relación a su anchura en la base, de lados rectilíneos y, en el envés del limbo, una densidad baja de pelos tumbados en los nervios,
- a las bayas de forma redondeada.

Evolución de las superficies cultivadas en Francia

| Año | 2000 | 2008 | 2018 |
|-----|------|------|------|
| ha | 44 | 33 | 20 |

Perfil genético

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 135 | 236 | 243 | 184 | 188 | 246 | 238 | 216 | 249 |
| Allele 2 | 147 | 261 | 249 | 186 | 194 | 250 | 254 | 251 | 271 |

Cultivo y habilidades agronómicas

El Florental es una variedad poco vigorosa.

Selección clonal en Francia

Todavía no existe un clon autorizado de esta variedad.

Fenología

Época de desborre: 3 días antes de la variedad Chasselas.
Época de maduración: precoz, una semana antes de la variedad Chasselas.

Potencial tecnológico

Los racimos del Florental son compactos, pequeños a medianos y las bayas son medianas. Permite elaborar vinos vulgares, ligeros, sin antocianinas diglucósidas.

Susceptibilidad a enfermedades y plagas

El Florental es sensible a la podredumbre gris y debe estar injertado.

Referencias bibliográficas

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, Francia.
- Fondo documental del Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, Francia.
- Cépages et vignobles de France, tomo 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, Francia.



Plantuva, todos los derechos reservados,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier