

Folignan B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1964 par l'INRA en croisant l'Ugni blanc et la Folle blanche.

Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

Nom de la variété en France

Folignan

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Folignan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune ou verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux moyens à profonds, à fonds arrondis, un sinus pétiolaire fermé à lobes chevauchants, des dents moyennes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté convexe et un côté concave, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, moyennement à fortement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle des poils dressés et une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

75

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	178	196	244	240	245	271
Allele 2	149	232	253	180	200	246	248	247	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Folignan est une variété de vigueur moyenne à forte avec un port demi-érigé à horizontal.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Folignan est moyennement sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Folignan porte le numéro 1053.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies du Folignan sont moyennes. Cette variété permet d'obtenir de vins aptes à l'élaboration d'eaux-de-vie de très bonne qualité. Les moûts peuvent être également utilisés en vue de l'élaboration de mistelles de qualité.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*