

Franc noir de la Haute-Saône N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire de l'Est de la France résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot noir et le Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Franc noir de la Haute-Saône

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Franc noir de la Haute-Saône est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes de grande taille, orbiculaires, entières, à trois ou à cinq lobes, des sinus latéraux à fond en U, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, un limbe tourmenté, révoluté, ondulé entre les nervures près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 1988 2018

ha 5 0.1

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	243	176	188	238	238	216	239
Allele 2	141	232	249	186	204	246	254	227	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Franc noir de la Haute-Saône est un cépage précoce, vigoureux, fertile et régulier.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Franc noir de la Haute-Saône est assez sensible au mildiou. Par contre, il est peu atteint par la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Franc noir de la Haute-Saône porte le numéro 1226. Des prospections ont été menées récemment dans le Nord Est.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, une demi-semaine à 1 semaine après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Franc noir de la Haute-Saône permet d'élaborer des vins de qualité convenable.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier