

# Gamay de Bouze N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété provient d'une mutation du Gamay.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Gamay de Bouze

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Gamay de Bouze est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Bulgarie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles légèrement bronzées,
- aux baies qui présentent une couleur de l'épiderme pratiquement verte jusqu'à la véraison et une pulpe colorée à maturité.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1998	2008	2018
ha	77	54	385	310	126

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	178	194	244	238	216	239
Allele 2	135	236	249	186	204	246	238	245	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Les aptitudes de ce cépage sont proches de celles des autres types de Gamay teinturier et du Gamay.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement du Gamay de Bouze vis-à-vis des maladies et des ravageurs est comparable à celui du Gamay.

### Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Gamay de Bouze portent les numéros 223 et 431. Un conservatoire d'une trentaine de clones a été planté en 2006 dans le vignoble du Rhône.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont petites et les baies sont petites à moyennes. Les vins obtenus sont colorés (moins que le Gamay Fréaux mais beaucoup plus que le Gamay). Ils sont moins fruités que ceux élaborés à partir du Gamay.



Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

