

# Ganson N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Grenache et le Jurançon.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Ganson

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Ganson est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois ou à cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire fermé ou à lobes chevauchants, des dents petites, courtes à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle et, à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	30	12	6	4.9

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	239	188	188	258	248	243	239
Allele 2	149	236	243	191	196	260	254	245	239

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété, assez précoce, présente un port érigé et une fertilité suffisante pour être taillée court et conduite en gobelet. Sa production est régulière.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Ganson est peu sensible à la pourriture grise.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Ganson porte le numéro 534.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Ganson donne des vins fins mais peu colorés et peu typés.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*