

Gouget N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage trouve son origine dans le vignoble du Centre de la France, vraisemblablement dans la région de Montluçon. D'après les analyses génétiques publiées, le Gouget est probablement un descendant du Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Gouget

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Gouget est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, en V, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	739	518	13	4	16	13	8.4
----	-----	-----	----	---	----	----	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	131	223	239	176	194	238	238	227	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	232	257	191	196	252	248	233	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage vigoureux, à port érigé est généralement taillé à long bois. Sa remise à fruit est bonne après une gelée de printemps.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Ce cépage donne un vin relativement acide, faiblement alcoolique, peu coloré et peu tannique.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Gouget est très sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*