

# Lledoner pelut N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété est une mutation du Grenache portant en particulier sur la villosité.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Lledoner pelut

## Synonymie

En Espagne, le Lledoner pelut est officiellement dénommé "Garnacha Peluda". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Lledoner pelut est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé et présence parfois d'une dent sur le bord, un lobe médian allongé, un limbe légèrement bullé et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	1998	2008	2018
ha	212	625	584	534	286

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage possède des caractéristiques et des aptitudes proches de celles du Grenache. Il est parfois considéré comme plus vigoureux, et présente une moindre sensibilité à la coulure.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Lledoner pelut présente des potentialités proches de celles du Grenache avec cependant l'obtention d'un degré naturel légèrement inférieur.

### Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Lledoner pelut portent les numéros 1055 et 1056.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Lledoner pelut réagit vis-à-vis des principales maladies comme le Grenache sauf avec les acariens pour lesquels il se montre plus sensible.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*