

Lledoner pelut N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété est une mutation du Grenache portant en particulier sur la villosité.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Lledoner pelut

Synonymie

En Espagne, le Lledoner pelut est officiellement dénommé "Garnacha Peluda". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Lledoner pelut est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé et présence parfois d'une dent sur le bord, un lobe médian allongé, un limbe légèrement bullé et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	1998	2008	2018
ha	212	625	584	534	286

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	223	239	191	188	258	240	243	239
Allele 2	143	238	243	191	188	258	254	243	249

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage possède des caractéristiques et des aptitudes proches de celles du Grenache. Il est parfois considéré comme plus vigoureux, et présente une moindre sensibilité à la coulure.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Lledoner pelut réagit vis-à-vis des principales maladies comme le Grenache sauf avec les acariens pour lesquels il se montre plus sensible.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Lledoner pelut portent les numéros 1055 et 1056.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Lledoner pelut présente des potentialités proches de celles du Grenache avec cependant l'obtention d'un degré naturel légèrement inférieur.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier