

Durif N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété issue d'un croisement entre la Syrah et le Peloursin, a été développée par M. Durif.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Durif

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Durif est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune ou verte,
- aux rameaux qui sont parfois fasciés à l'extrémité,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux très profonds, ouverts à fonds arrondis, un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents petites, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe vert foncé, finement bullé, parfois plissé près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées

Année	1958	1968	1979	2018
ha	530	359	9	5.9

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	229	239	176	194	252	240	227	239
Allele 2	149	229	251	188	200	252	248	235	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Durif est un cépage peu à moyennement vigoureux avec un port demi-érigé à horizontal. Assez fertile, il peut être taillé court. Les baies sont sensibles au grillage et au flétrissement. Ce cépage est également assez sensible aux gelées d'hiver.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies du Durif sont moyennes. Le potentiel en sucre de ce cépage est moyen et il permet d'élaborer des vins colorés, assez tanniques et astringents mais peu fruités.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Durif porte le numéro 1130.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Durif est sensible aux maladies du bois, à la pourriture grise et au black rot mais il est peu atteint par le mildiou.

Phénologie


Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*