

# Meslier Saint-François B

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.



## Origine

Ce cépage originaire de l'Ouest de la France résulterait d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Chenin.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve et pour eaux-de-vie.

## Nom de la variété en France

Meslier Saint-François

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Gros Meslier" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Meslier Saint-François est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, de couleur vert foncé, entières ou à cinq lobes avec des sinus latéraux peu profonds à fond en U, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe épais, légèrement involuté et tourmenté, bullé, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés et une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	2336	1851	589	221	60	30	8
----	------	------	-----	-----	----	----	---

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	229	239	172	188	238	238	227	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	232	239	176	196	248	240	233	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à débourrement précoce craint les gelées de printemps. Le Meslier Saint-François est un cépage fertile mais de vigueur faible à modérée.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Meslier Saint-François porte le numéro 1325.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Ce cépage donne des vins peu alcooliques, assez plats et légers. Les eaux-de-vie obtenues à partir de ses vins sont fines et ont du bouquet.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sensible au black rot et au mildiou. En revanche, il se montre assez sensible à l'oïdium et très sensible à la pourriture acide.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*