

Mondeuse blanche B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire de la Savoie ne correspond pas à la mutation blanche de la Mondeuse. Il s'agit d'un cépage distinct.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Mondeuse blanche

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, la Mondeuse blanche est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles bronzées,
- aux feuilles adultes vert clair, de taille moyenne, orbiculaires, à cinq lobes, des sinus latéraux à fond en V, avec un sinus pétiolaire ouvert à fond en U, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe faiblement bullé, légèrement frisé sur les bords, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1979	1988	1998	2008	2018
ha	1	21	7	5	6	8.1

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	225	239	186	188	252	240	216	239
Allele 2	149	229	260	188	194	260	262	257	261

Aptitudes culturales et agronomiques

La Mondeuse blanche possède un port retombant.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Mondeuse blanche porte le numéro 1214.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. La Mondeuse blanche permet l'élaboration de vins ordinaires, assez alcooliques (bon potentiel d'accumulation des sucres) et moyennement acides. Les vins peuvent être un peu aromatiques si la récolte est effectuée à maturité.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier