

# Monerac N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété, obtenue par l'INRA en 1958, provient d'un croisement entre le Grenache et l'Aramon.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Monerac

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Monerac est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe à la face inférieure avec une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	1998	2008	2018
ha	2	2	3	1.9

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	135	223	239	178	188	244	240	227	239
Allele 2	141	232	239	191	196	258	254	243	249

### Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété vigoureuse, à port demi-érigé doit être taillée court. Elle peut être conduite en gobelet ou palissée. Sa production est régulière.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Monerac est peu sensible à la pourriture grise car ses grappes sont assez lâches.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Monerac porte le numéro 536.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes à grosses. Le potentiel d'accumulation des sucres de ce cépage est relativement élevé. Les vins sont peu astringents mais manquent parfois de couleur. Le Monerac est bien adapté pour la production de vins rosés.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*