

# Muscadelle B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est probablement originaire du Sud-Ouest. Il se rencontre également à l'état de trace dans le Centre de la France (Cher). D'après les analyses génétiques publiées, c'est vraisemblablement un descendant du Gouais blanc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Muscadelle

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, la Muscadelle est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Roumanie.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes cunéiformes, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	6257	5720	3710	2763	2151	1713	1434

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	137	223	239	176	188	238	238	245	261
Allele 2	141	232	239	182	196	252	254	247	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage vigoureux doit être convenablement palissé et implanté sur des parcelles bien exposées afin de limiter les risques de pourriture grise.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Muscadelle est sensible à l'oïdium, aux guêpes, aux vers de la grappe et très sensible à la pourriture grise.

### Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Muscadelle portent les numéros 610, 1216 et 1217. Un conservatoire d'environ 90 clones a été implanté dans le Bergeracois (Dordogne) en 1996. Un autre conservatoire de près de 50 clones a été installé dans le Lot-et-Garonne en 2006.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 11 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. A maturité, la Muscadelle permet d'obtenir des vins moyennement alcooliques, peu acides et légèrement aromatiques. Ils sont parfois sensibles à l'oxydation.



