

Muscardin N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Muscardin est un cépage autochtone des Côtes du Rhône.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Muscardin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Muscardin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes grandes, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire fermé ou à lobes légèrement chevauchants, des dents à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe fortement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité nulle ou faible des poils couchés,
- aux baies de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1	25	10	17	16	16

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	250	240	235	239
Allele 2	131	229	249	182	202	252	248	259	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage à rameaux longs nécessite une conduite avec un palissage suffisant.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Muscardin est un peu sensible à la pourriture grise mais est sensible à l'esca.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Muscardin porte le numéro 1101. Il est issu de prospections menées dans les Côtes du Rhône. Un conservatoire d'une vingtaine de clones a été implanté en 2001 dans les Côtes du Rhône.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Muscardin a un potentiel en sucre assez faible à moyen. Il permet d'obtenir des vins relativement acides et peu colorés avec une belle finesse.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier