

Arriloba B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1954 par l'INRA en croisant le Raffiat de Moncade et le Sauvignon.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Arriloba

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Arriloba est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à trois lobes (rarement cinq lobes) avec un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents longues à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique moyenne des nervures, un limbe tourmenté, involuté et, à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|
| ha | 10 | 58 | 59 | 33 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 178 | 188 | 244 | 240 | 235 | 239 |
| Allele 2 | 131 | 229 | 249 | 186 | 188 | 246 | 240 | 245 | 239 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété est vigoureuse, fertile et productive. Elle est parfois sensible au dessèchement de la rafle. Elle se montre bien adaptée pour la récolte mécanique.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Arriloba résiste bien à la pourriture grise (pellicules épaisses).

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Arriloba porte le numéro 762.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne et les baies sont très petites. Le vin est assez fin et légèrement bouqueté.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier