

# Olivette blanche B

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété d'origine inconnue ne correspond pas à la forme blanche de l'Olivette noire.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Olivette blanche

## Synonymie

En Italie, l'Olivette blanche est officiellement dénommée "Ciminnita". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, l'Olivette blanche est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières ou à cinq lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert, à fond en V, des dents petites, courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation des nervures nulle, un limbe lisse, brillant, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et des poils couchés,
- aux fleurs de sexe femelle,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	2000	2008	2018
ha	19	15	1	2	1.1

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	232	243	182	188	252	254	243	261
Allele 2	135	236	249	191	204	258	254	259	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Olivette blanche est une variété tardive, de vigueur moyenne, à port érigé à demi-érigé. Elle peut être conduite en taille longue. De par son caractère femelle, l'Olivette blanche est très sensible à la coulure et au millerandage.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Olivette blanche est très peu sensible à la pourriture grise.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et lâches. Les baies sont grosses, de taille irrégulière du fait du millerandage, avec une pellicule épaisse et une pulpe charnue à saveur simple.



Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier