

# Abondant B

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété cultivée dans l'Est de la France a été sélectionnée par A. Wanner. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre la Madeleine royale et le Kövidinka.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Abondant

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Abondant est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel:

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes de grande taille, entières avec un sinus pétiolaire peu ouvert à bords parallèles ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement gaufré, plissé près du point pétiolaire, bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
ha	21	14	3	2	0.8

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	141	225	247	178	194	246	248	216	251
Allele 2	149	238	249	184	194	252	254	247	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Abondant est une variété vigoureuse, fertile en taille courte. Son débourrement précoce l'expose aux gelées de printemps.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes à grosses. L'Abondant donne des vins blancs assez neutres et ordinaires.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Abondant porte le numéro 1376.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


L'Abondant est sensible à la pourriture grise.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

### Debourement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*