

Abondant B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété cultivée dans l'Est de la France a été sélectionnée par A. Wanner. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre la Madeleine royale et le Kövidinka.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Abondant

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Abondant est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel:

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux rameaux avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes de grande taille, entières avec un sinus pétiolaire peu ouvert à bords parallèles ou à lobes légèrement chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe légèrement gaufré, plissé près du point pétiolaire, bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
-------	------	------	------	------	------

ha	21	14	3	2	0.8
----	----	----	---	---	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	141	225	247	178	194	246	248	216	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	238	249	184	194	252	254	247	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Abondant est une variété vigoureuse, fertile en taille courte. Son débourrement précoce l'expose aux gelées de printemps.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes à grosses. L'Abondant donne des vins blancs assez neutres et ordinaires.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*