Perdin B

Variété d’agrément pour amateurs.

Origine

Cette variété a été obtenue en 1981 par l’INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le 7489 INRA et la Perle de Csaba.

Utilisation

Variété d’agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Perdin

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Perdin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

Éléments de description

L’identification fait appel :
- à l’extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées ou rougeâtres,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes chevauchants, à fond en U, souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents courtes à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe moyennement bullé, tourmenté ou involuté, parfois gaufré ou ondulé près du point pétiolaire, et à la face inférieure une densité nulle ou très faible des poils couchés et une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte, à saveur muscatée ou aromatique.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	2018
ha	1

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	176	202	256	240	245	271
Allele 2	143	234	260	186	204	262	240	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Perdin possède une vigueur moyenne. C'est une variété avec un port demi-érigé à horizontal qui doit être palissée et qui peut être conduite en taille courte ou en taille longue. Le Perdin est un peu sensible au millerandage.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Perdin porte le numéro 5003.

Potentialités technologiques

Les grappes du Perdin sont moyennes. Les baies sont également moyennes, juteuses, avec une pellicule peu épaisse.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Perdin est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, au black rot et à la pourriture grise mais il doit être greffé.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés