

Persan N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage se rencontre en Savoie et en Isère.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Persan

Synonymie

En Italie, le Persan est officiellement dénommé "Becuet". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Persan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune ou verte à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes de grande taille, de couleur vert foncé, orbiculaires à réniformes, à cinq lobes avec un sinus pétiolaire ouvert, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe involuté, parfois gaufré, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique longue.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	201	179	18	8	3	6	20

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	149	225	239	182	188	240	248	233	239
Allele 2	149	236	257	186	194	252	262	233	251

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Persan est un cépage vigoureux généralement taillé long, palissé, et conduit en souches à grand développement. Il donne de bons résultats sur les sols d'éboulis calcaires.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Persan donne des vins tanniques aptes au vieillissement avec une bonne acidité.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Persan porte le numéro 1110. Un conservatoire d'une quinzaine de clones a été planté en 1999 dans le vignoble de Savoie.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Persan est sensible au mildiou et à l'oïdium.

Phénologie


Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, sous le nom de "Becuet", [[site web](#), consulté en 2020].



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*