

Arrufiac B

Variété de raisin de cuve.



Origine

L'Arrufiac est un cépage autochtone du Sud-Ouest (vallée de l'Adour).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Arrufiac

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Arrufiat" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, l'Arrufiac est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles vertes à plages légèrement bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds de couleur rouge ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes avec des sinus latéraux profonds à base en U avec présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire au fond souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, une forte pigmentation anthocyanique des nervures et des pétioles, un limbe bullé et ondulé et, à la face inférieure, une faible densité des poils couchés,
- aux grappes de forme conique, un peu compactes,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement ovoïdes.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1988	2000	2008	2018
ha	271	178	99	119	93	31

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	249	176	200	256	240	233	239
Allele 2	141	229	262	178	204	260	254	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage possède une bonne vigueur. Sa fertilité est généralement bonne mais peut être irrégulière. Il présente parfois une sensibilité au millerandage.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Arrufiac est assez sensible au mildiou et au black rot.

Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés d'Arrufiac portent les numéros 405, 652, 653, 921 et 922. Deux conservatoires ont été implantés en 1996 et 1997 dans le Gers et les Hautes-Pyrénées ; ils assurent la préservation de 150 clones environ.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies petites à pellicule épaisse. Ce cépage possède un potentiel qualitatif intéressant, notamment au niveau des arômes et de leur typicité.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

