

Picardan B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire du Sud de la France.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Picardan

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Araignan" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Picardan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes ou à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes cunéiformes ou pentagonales, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes légèrement chevauchants, des dents grosses, de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe finement bullé parfois gaufré, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1988	2018
ha	60	10	2.9

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	196	238	248	233	239
Allele 2	135	238	249	188	204	252	254	235	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Picardan est un cépage de vigueur moyenne avec un port demi-érigé, qui doit être taillé court et de préférence palissé. Ce cépage sensible à la carence en magnésium est bien adapté aux zones chaudes et aux terroirs secs et peu fertiles.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Picardan permet d'élaborer des vins fruités, assez fins avec une acidité moyenne. Le potentiel en sucre de ce cépage est également faible à moyen.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Picardan porte le numéro 1183.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Picardan est sensible à l'oïdium et un peu sensible à la pourriture grise.

Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie à 4 semaines après le Chasselas.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*