

Pinot blanc B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété correspond à la mutation blanche du Pinot noir.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Pinot blanc

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Pinot blanc est officiellement désigné par d'autres noms : Beli pinot (Slovénie), Pinot Bianco (Italie, Malte), Rulandské biele (Slovaquie) et Weisser Burgunder (Allemagne, Autriche). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Pinot blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Hongrie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie.

Éléments de description

La description correspond à celle du Pinot noir, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est vert-jaune. De plus, les feuilles adultes du Pinot blanc sont souvent moins découpées que celles du Pinot gris et du Pinot noir.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	610	812	1491	1565	1503	1262	1280

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	225	239	182	188	240	238	216	239
Allele 2	149	236	243	186	194	246	248	235	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Pinot blanc est un cépage assez vigoureux et de production régulière (plus productif que le Pinot gris ou le Pinot noir). Un peu sensible à la chlorose, il convient aux sols profonds, assez chauds, pierreaux ou non. Le Pinot blanc présente aussi une bonne résistance au froid.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est assez délicat car relativement sensible aux principales maladies.

Sélection clonale en France

Les cinq clones agréés de Pinot blanc portent les numéros 54, 55, 1294, 1295 et 1296. Une collection-conservatoire regroupant environ 200 clones a été installée en Alsace en 1984. Deux autres conservatoires ont été implantés : un en Champagne, comprenant 24 clones, et un autre en Côte-d'Or en 1993, comprenant 14 clones.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites à moyennes et les baies sont de petite taille. Le Pinot blanc permet d'élaborer des vins agréables, légèrement corsés avec une acidité moyenne. Il peut servir également à l'élaboration de vins de base pour effervescents.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*