

Ravat blanc B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Ravat blanc (Ravat 6) est un hybride interspécifique obtenu par J-F. Ravat. D'après les analyses réalisées à Montpellier, il proviendrait d'un croisement entre le 8724 Seibel et le Plantet (5455 Seibel).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Ravat blanc

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Ravat 6" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Ravat blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles brillantes, de couleur verte,
- aux feuilles adultes réniformes, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en U ou en V très ouvert, des dents moyennes, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe brillant, et à la face inférieure une densité nulle à très faible des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2000	2008	2018
ha	600	567	1	21	15	8.9

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	188	250	240	237	249
Allele 2	147	261	243	184	188	260	254	251	249

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Ravat blanc est une variété peu fertile avec un port demi-érigé, qui doit être conduite en taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Ravat blanc résiste bien au mildiou mais il est très sensible à l'oïdium, à l'anthracnose et à la pourriture grise. Il doit également être greffé.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Ravat blanc porte le numéro 1198.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont petites. Les baies sont également petites et peuvent devenir roses à maturité. Le potentiel en sucre du Ravat blanc est bon mais les vins obtenus sont sensibles à l'oxydation et de qualité plutôt médiocre.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier