


# Ribol N

Variété de raisin de cuve et de table.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant l'Olivette blanche et l'Alphonse Lavallée.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve et de table.

## Nom de la variété en France

Ribol

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Ribol est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Il est classé en tant que variété de cuve seulement dans certains départements (voir réglementation en vigueur). Cette variété est également inscrite au catalogue de la Croatie et du Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel:

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux rameaux avec une pigmentation nulle des nœuds et des entre-nœuds,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à trois lobes avec un sinus pétioinaire ouvert à peu ouvert en V, des dents moyennes à longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe finement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique avec une pruine importante.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	1998	2008	2018
ha	10	74	180	165	78

## Profil génétique

	Microsatellite VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	182	204	252	238	243	261
Allele 2	135	234	255	191	204	258	254	259	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Ribol est une variété de vigueur moyenne à forte avec un port érigé à demi-érigé. Elle peut être conduite en taille courte ou en taille longue modérée et elle est très peu sensible au millerandage.

### Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Ribol porte le numéro 503.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

### Débourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
  - Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- 



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*