

Aubin vert B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage originaire du Nord-Est de la France (Lorraine) résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Gouais blanc et le Pinot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Aubin vert

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, l'Aubin vert est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes à trois lobes avec un sinus pétiolaire en V ou à bords parallèles, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe légèrement ondulé, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou obovoïde.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	141	225	239	176	188	238	248	227	239
Allele 2	149	232	243	186	196	246	254	235	271

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aubin vert est un cépage assez fertile et productif que l'on doit tailler modérément.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Aubin vert ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé pour ce cépage. Des prospections ont été menées récemment dans les vignobles du Nord-Est.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine et demie à 2 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. L'Aubin vert donne des vins communs, peu alcooliques et relativement acides.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier