

# Rivairenc N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire du Languedoc.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Rivairenc

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Aspiran noir" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Rivairenc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés avec présence d'une forte pigmentation anthocyanique,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe finement bullé, tourmenté et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1988	2018
ha	99	23	7	7

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	247	176	204	252	240	227	239
Allele 2	131	223	249	178	204	260	248	257	261

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Rivairenc est un cépage de vigueur modérée avec un port assez érigé, qui doit être taillé court. Ce cépage est bien adapté aux zones chaudes et aux terroirs secs et peu fertiles. Le Rivairenc est par ailleurs sensible aux gelées d'hiver.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses à très grosses. Le Rivairenc permet d'élaborer des vins assez légers et peu colorés. Le potentiel en sucre de ce cépage est assez faible.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Rivairenc porte le numéro 1152.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Rivairenc est peu sensible à la pourriture grise. Il est par contre plus sensible à l'oïdium et au mildiou.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*