

# Romorantin B

# Variété de raisin de cuve.







# Origine

Ce cépage semble être originaire du centre de la France et résulterait, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot teinturier et le Gouais blanc.

#### Utilisation

Variété de raisin de cuve.

### Nom de la variété en France

Romorantin

### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Danery" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

### Données règlementaires

En France, le Romorantin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge-violacé,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert en V, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, un limbe involuté avec les bords révolutés, grossièrement bullé, gaufré et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement aplatie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	680	581	271	156	231	74	79

# Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	126	232	243	176	188	238	238	227	249
Allele 2	131	236	249	186	204	246	248	235	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage est assez fertile, productif et a un port érigé. Il peut être conduit en taille longue ou courte. Il doit être implanté sur des terroirs adaptés et précoces.

### Sélection clonale en France

Les quatre clones agréés de Romorantin portent les numéros 466, 873, 928 et 929. Un conservatoire d'une cinquantaine de clones a été mis en place en 2007 dans le Loir-et-Cher.

### Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses alors que les baies sont petites. Le Romorantin permet d'élaborer des vins assez fins, fruités et agréables.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs


Le Romorantin est moyennement sensible à la pourriture grise et aux vers de la grappe.

## Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie à 3 semaines après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier