

Saint-Macaire N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire du vignoble bordelais.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Saint-Macaire

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Saint-Macaire est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune ou verte,
- aux feuilles adultes à trois, cinq ou sept lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire peu ouvert à base en U ou à lobes légèrement chevauchants, des dents petites, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe tourmenté, fortement bullé, parfois gaufré, et à la face inférieure, une forte densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2018
-------	------	------	------	------	------

ha	200	110	25	7	0.4
----	-----	-----	----	---	-----

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
----------------	------	------	------	-------	---------	---------	-------	-------	-------

Allele 1	141	223	239	176	188	252	254	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	153	238	249	186	200	252	254	247	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Saint-Macaire est un cépage vigoureux, peu fertile en taille courte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Saint-Macaire est sensible à l'oïdium.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Saint-Macaire porte le numéro 1218.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes. Le Saint-Macaire permet d'élaborer des vins très colorés mais assez communs et relativement acides.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*