

Sultanine B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété de raisin de table d'origine naturelle est cultivée dans de nombreux pays.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Sultanine

Synonymie

Dans l'Union européenne, la Sultanine est officiellement désignée par d'autres noms : Sultanina (Bulgarie, Espagne, Portugal), Sultanina bianca (Italie) et Soultanina (Grèce). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, la Sultanine est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Croatie, Espagne, Grèce, Italie et Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible ou très faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles jaunes et brillantes,
- aux feuilles adultes orbiculaires, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire à lobes chevauchants ou très chevauchants, des dents courtes à moyennes, à côtés rectilignes, celles correspondant aux nervures principales étant un peu plus longues, une pigmentation des nervures nulle, un limbe lisse, mince, brillant, involuté sur les bords, parfois gaufré, plissé au point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité nulle des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique longue ou ovoïde.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	143	232	239	178	188	248	238	216	249
Allele 2	149	232	253	191	188	260	248	243	249

Aptitudes culturales et agronomiques

La Sultanine est une variété extrêmement vigoureuse, avec un port demi-érigé à horizontal. Elle doit être palissée et conduite en taille longue. Pour obtenir une bonne initiation florale, la Sultanine nécessite des conditions d'éclairement et de température très favorables. Ainsi, en France, sa fertilité est généralement nulle ou très faible.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Sultanine porte le numéro 919.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses, ailées et de compacité moyenne. Les baies sont apyrènes, moyennes avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe croquante à saveur simple, agréable et peu acide. Pour la production de raisin de table, les traitements à l'acide gibbérélique et la pratique de l'incision annulaire permettent d'augmenter la taille des baies. La Sultanine est également la principale variété utilisée pour la production de raisins secs.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Sultanine est très sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'antracnose, à la pourriture grise ainsi qu'à l'excoriose.

Debourement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*