

# Terret gris G

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Cette variété correspond à la mutation grise du Terret noir.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Terret gris

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Terret-Bourret" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Terret gris est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Croatie.

---

## Éléments de description

La description correspond à celle du Terret noir à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui est grise et aux baies qui sont de forme elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	15017	13384	8987	6191	214	131	40
----	-------	-------	------	------	-----	-----	----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Terret gris présente des aptitudes comparables à celles du Terret noir. Il se montre également assez sensible à la brunissure.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Terret gris porte le numéro 1219. Des travaux de sélection sont en cours suite à des prospections menées dans le vignoble de l'Hérault. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans l'Hérault en 2003.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie à 5 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Terret gris donne des vins neutres et de faible degré.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le comportement du Terret gris vis-à-vis des maladies est comparable à celui du Terret noir.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*